

Question proposée n° 1. Pourquoi certaines Tumeurs doivent être extirpées, et d'autres simplement ouvertes; dans l'une et l'autre de ces opérations, quels sont les cas où le Cautère est préférable à l'Instrument tranchant, et les raisons de préférence.

Labor improbus, Omnia vincit

Dans le tems d'une paix profonde et dans l'attente des victoires, un Prince généreux toujours attentif aux différens besoins de ses sujets, descend jusqu'au soin de les sécourir dans leurs différentes infirmités: C'est dans cette vue que cet Illustre Monarque élève un Art qui a souvent arrêté le coup fatal, qui aloit terminer les nobles exploits de ses plus fameux guerriers, et qu'il le fait triompher de cet abaissement où la négligence l'avoit anciennement réduit, et où l'envie avoit formé le dessein de le faire retomber.

Le premier pas que vous faite Messieurs pour seconder une entreprise aussi importante à tout l'Univers, fait autant d'éloge de votre modestie que de vos lumières, et certainement vous auriez d'abord arrêté les plumes les plus savantes, si on n'étoit persuadé, que vous cherchez plutôt à faire des compagnons de votre gloire, qu'à apprendre le dévouement d'une Question que vous pouvez décider en maîtres.

Quoique la Question que vous proposez, roule sur un genre de maladie si fréquent en Chirurgie, qu'il semble qu'aucun Chirurgien n'en doive ignorer le traitement, il en est néanmoins d'une si grande importance, et dont la cure est si difficile, qu'elle peut arrêter les plus expérimentés.

Ces maladies comprennent toutes les élévations contre nature qui paroissent sur la superficie du corps de l'homme, et



RC 13

12

VONS n° 16

quoique toutes celles qui dérangent l'ordre naturel de ses fonctions semblent ne point échapper à la proposition, je suis néanmoins persuadé, que vous en avez excepté celles que le déplacement des parties solides peut produire. Cependant pour ne rien laisser à désirer, j'exposerai en peu de mots au commencement de cette Dissertation, les moyens dont on sert pour le traitement de cette dernière espèce de Tumeur.

Ainsi, les Tumeurs qui feront la matière principale de ce discours, seront toutes celles que les parties fluides peuvent causer, lorsqu'elles s'arrêtent dans les cavités des solides, ou qu'elles s'épanchent dans leurs intervalles, et qu'elles en dérangent le diamètre et le tonus, soit par leur exier, soit par les dispositions étrangères, que des causes tant internes qu'externes peuvent leur communiquer.

Tant que le diamètre et le ressort des solides sont dans leur état naturel, que le caractère, le volume et le mouvement du fluide sont déterminés, les liqueurs ne traversent que les tuyaux qui leur sont propres, et elles n'ont de mouvement, qu'autant qu'il leur en est nécessaire pour les parcourir sans troubler leur action; et elles réciproquement les solides n'ont de force, qu'à proportion de la colonne du liquide qui traverse leurs cavités, de sorte qu'ils ne le poussent qu'avec ordre de partie en partie, et ils ne ^{le} laissent languir dans leur substance, que le tems nécessaire pour y laisser les parties nourricières, qu'une transpiration continuelle en enlève.

Dès que cet ordre est dérangé, c'est-à-dire, lorsque la quantité du liquide n'est plus proportionnée au diamètre des solides, que sa qualité est changée, et que son mouvement est indéterminé, ou que le diamètre des solides est augmenté ou diminué et que leur tonus est déréglé, il arrive alors, ou que

les fluides languissent dans la substance des parties, ou qu'ils suivent indistinctement les routes qui se rencontrent dans leur passage, qui pour la plupart leur sont étrangères: Or le liquide ne peut passer dans un tissu qu'il n'a point coutume de traverser, qu'il n'y cause quelque embarras, et par conséquent qu'il n'en change l'habitude naturelle, de même il ne sauroit s'arrêter dans ses propres tissus qu'il n'y contracte des adhérences, qu'il ne les obstrue, et par une suite nécessaire qu'il n'en blesse l'action.

Par quelque cause que ce soit que les liqueurs s'engagent dans ces routes étrangères, ou qu'elles s'arrêtent dans les tissus où elles circulent d'ordinaire, elles en doivent forcer le diamètre, porter la partie au delà de son étendue naturelle, par conséquent en corrompre la conformation et en déranger les fonctions; ainsi on peut définir l'espèce de Tumeur dont il s'agit, une élévation contre nature, produite par un amas d'humeurs qui blesse l'action de la partie.

Lorsque ces Tumeurs résistent à l'action des remèdes qu'on leur applique à dessein de les dissiper, elles doivent être ouvertes ou extirpées, et selon leur caractère particulier, l'une ou l'autre opération doit se faire avec l'instrument ou le caustique, pourvu que la Tumeur se trouve dans les circonstances de la nécessité et de la possibilité, hors desquelles les opérations les mieux indiquées, et les plus adroitement faites deviennent infructueuses.

Il est donc très important pour le Chirurgien, avant que d'entreprendre ces opérations, d'examiner attentivement, si la situation de la Tumeur peut permettre sans danger d'y porter l'instrument et si les adhérences à quelques parties respectables, ne forment point de contre indication; Il doit de même faire attention à la cause de la

4 5

Tumeurs, au tempérament, aux forces, à l'âge et au sexe du malade, circonstances qui font prendre des précautions qui concourent à l'heureux succès de l'opération; C'est pourquoi j'avertis icy, crainte de tomber dans une ennuyeuse répétition, que dans l'ouverture ou extirpation des Tumeurs dont je vais faire l'énumération, on ne peut perdre de vue ces attentions, sans encourir le risque de faire une opération, autant d'avantageuse au malade, qu'à la gloire de la Chirurgie.

Ouvrir une Tumeur, c'est y faire des incisions, qui la séparent en deux ou plusieurs parties, afin d'évacuer la matière qu'elle contient, ou d'ébrider les parties trop tendues, pour prévenir les accidens que causeroit leur étranglement.

Extirper au contraire, c'est emporter et même déraciner une Tumeur, soit que cela se fasse avec l'instrument ou le caustique, ou qu'on emporte ^{la Tumeur} (quoiqu'en disent vos jaloux censeurs) dans un instant ou à plusieurs fois.

Pour donner un ordre à cette matière et résoudre sans confusion (autant que mon faible génie peut me le permettre) une Question aussi importante, voici quel est mon dessein; je partage cette Dissertation en deux parties, dans la première en désignant quelles sont les Tumeurs qui doivent être extirpées, ou simplement ouvertes, j'examinerai les raisons qui nous déterminent à pratiquer l'une de ces opérations préférablement à l'autre; et dans la deuxième je ferai remarquer celles où l'on doit se servir de l'instrument ou du caustique pour l'une ou l'autre de ces opérations, et les raisons qui nous engagent par préférence à nous servir de l'une ou l'autre. Hopp heureux! si le Zèle avec lequel je travaille, pouvoit être de quelque utilité, utilité pour l'éclaircissement d'une matière aussi importante à la Chirurgie (et qu'il me soit permis ~~de~~ ^{de} le dire) si négligée par les Anciens.

5
Pourquoi certaines Tumeurs doivent être extirpées,
et d'autres simplement ouvertes.

Quoiqu'une division exacte des Tumeurs ne soit pas absolument nécessaire, pour rendre précisément raison de la Question proposée, on ne peut néanmoins se dispenser d'en faire une distinction, qui renferme leurs principaux caractères.

Les éminences contre nature qui arrivent au corps humain, sont formées en général par des parties solides ou fluides: sans entrer dans le détail des parties qui peuvent former les premières, je me contenterai de dire, que toutes celles qui sont sujettes à la Question proposée doivent être simplement ouvertes avec l'instrument, puis que dans ces opérations le Chirurgien n'a d'autre intention que celle de réduire en leur lieu naturel, des parties que l'extirpation détruiroit, non sans causer une mort certaine au malade, et qui couvreroient grand risque, si pour les découvrir on emploioit le caustère actuel ou potentiel, quelque sagement conduit qu'il pût être. Je passe donc à celles, qui comme nous l'avons dit, et dessus font la matière principale de ce discours.

Personne n'ignore que la masse du sang, quoique homogène par rapport à tout le corps, ne soit composée de parties essentiellement différentes, et que les usages auxquels elles sont destinées, a obligé la Nature à leur tracer des routes différentes, pour circuler tantôt ensemble dans des routes communes à toute la masse, et tantôt séparément dans d'autres propres aux liqueurs particulières qui s'en séparent. Tant qu'elles sont confonduës sous une même masse, alors, comme on les nomme le sang général de sang, et qu'elles circulent dans les artères et veines sanguines, alors connues sous le nom général de sang, elles forment le principal contre poids des solides: Mais la nécessité des filtrations et du remplacement des pertes que le corps effuie continuellement, oblige les différentes liqueurs contenues dans cette masse, à enfilier dif



6 7
routes particulières à chacune d'elles. Celle qui se sépare la plus
immédiatement du sang, est cette partie branchue, douce, blanche,
limpide, destinée à la formation du sue nourricier, que les artères
lymphatiques vont répandre dans les parties les plus secrètes du corps;
c'est elle aussi qui forme la matière principale des autres humeurs
excrémentielles ou excrémentielles, si on en excepte quelques vues
qui partent immédiatement des extrémités des vaisseaux sanguins. On
peut donc généralement parlant réduire toutes les humeurs contenues
dans le corps de l'homme, sous trois classes différentes. La première
renfermera la masse sanguine, contenue dans les vaisseaux sanguins.
La 2^e contiendra la limphe encore renfermée dans les vaisseaux
lymphatiques. Et dans la 3^e nous renfermerons toutes les différentes
filtrations, soit qu'elles partent immédiatement du sang, ou de la limphe.
Sur cette idée nous établissons en général trois différentes espèces de Tumeurs
simples, que nous nommerons sanguines, lymphatiques et excrémentielles.

Sous le nom de Tumeur sanguine, on comprend toutes celles dans
lesquelles le sang arrêté dans ses propres vaisseaux, ou engagé dans des
routes qui lui sont étrangères, porte plus ou moins précipitamment la
partie au-delà de ses bornes naturelles, et les rend quelques fois
susceptibles de violentes douleurs.

Les Tumeurs lymphatiques, comprennent toutes celles où la limphe
arrêtée dans ses propres tuyaux, ou répandue dans leurs intervalles,
ne porte que lentement, et avec peu de douleur, la partie au-delà de
son étendue naturelle.

La 3^e espèce renfermera toutes les Tumeurs, formées par le
séjour des humeurs filtrées du sang, ou de la limphe, arrêtées par
quelque cause que ce soit dans les tuyaux destinés à les contenir,
à les jeter hors du corps, ou à les verser dans les réservoirs propres
à les garder quelque temps; telles sont par exemple les Tumeurs

7
produites par le lait gromelé dans les mammelles, par les larmes
engorgées dans le conduit lacrymal, et plusieurs autres.

Outre ces trois genres de Tumeurs, qui peuvent être appelées simples,
le mélange des liqueurs en produit encore une autre espèce, connue
sous le nom de Tumeur composée, à la formation de laquelle on ne
peut disconvenir que le sang, la lymphé, le suc nourricier propre
de la partie, la graisse, la matière de la transpiration, et celle de la
sécrétion particulière qui se fait dans la partie, où se forme cette
espèce de Tumeur, ne participent mutuellement; telles seront
par exemple, les Phlegmons, les Parotides &c.

On peut encore ranger sous cette espèce de Tumeur, celles qui
dépendent d'une nutrition multipliée et dégénérée, qui augmente le
volume de la partie, à proportion qu'elle se porte de
mauvais sucs plus capable d'une transformation charnue, que d'une
fermentation, ce qui fait que les tuyaux qui les reçoivent et les moules
dans lesquels ils s'enchaînent, se dilatent et se prolongent, à
proportion que les parties qui les recouvrent sont capables
d'extension, et dans lesquelles les liqueurs circulent toujours, telles
sont les Polypes, Sarcomes, Condilomes, Verrues &c.

Tant que les liqueurs dont nous venons de parler, se jettent
dans leurs tuyaux, elles forment un engorgement qui produit une
espèce particulière de Tumeur: Mais dès lors que les tuyaux qui les
contiennent, viennent à s'ouvrir, soit par leur extension forcée,
soit par l'action corrosive de la matière arrêtée, ces liqueurs se
repandent dans l'intervalle des parties et forment alors une Tumeur
par épanchement.

Les Tumeurs par engorgement se forment ou par le séjour des
liqueurs dans plusieurs tuyaux, ainsi qu'il arrive dans l'Erysipèle



le Phlegmon, l'Adome, le Squirre, ou lorsque la liqueur ne
s'arrête que dans une partie du Tuyau par la faiblesse de ses membranes,
comme cela se remarque dans l'Anévrisme vrai, les Varices et les
Hydatides. L'épanchement de même peut arriver, ou par la division
des tuyaux, comme cela se voit dans l'Anévrisme faux, les Contusions,
les Abcès et certaines Hydrocystes, ou lorsque les liqueurs par
une transpiration forcée, passent au travers des pores des tuyaux
et tombent dans leurs intervalles, ce qui se remarque principalement
dans les Adomes cérébraux et quelques fois dans les Erysipèles, qui passent
au Phlegmon; on nomme cette dernière espèce de Tumeur, faite par
infiltration. Après cette légère histoire des Tumeurs, tâchons de
déterminer pourquoi on en doit simplement ouvrir certaines et
extirper les autres.

La loi naturelle nous dit qu'il faut se servir autant qu'il est
possible des moyens les plus doux pour le traitement des maladies;
ce qui me fait poser pour principe, qu'il ne faut jamais extirper une
Tumeur, que lorsque la simple ouverture, ne peut la guérir radicalement,
parce que les désordres de l'extirpation, sont bien plus difficiles à réparer,
que ceux de la simple division: De ce principe général on peut tirer
les corollaires suivans.

1.^o que l'on ne doit jamais entreprendre l'extirpation d'une Tumeur,
que lorsque le fluide arrêté, et le solide qui le contient, se
trouvent mutuellement transformés en une masse, que la suppuration
ne peut emporter, excepté celles où la violence des accidens, la
malignité de la matière, ou la crainte de la débilité, dont les
désordres sont plus à craindre que ceux de l'extirpation, nous forment à
en venir à cette extrémité, telles sont les Charbons et les Anthrax.

2.^o toutes les Tumeurs par épanchement, ne doivent absolument
qu'être ouvertes, excepté que la matière, ne doit renfermée dans

une poche particulière, alors la Tumeur est sujette à l'extirpation.

3^o les Tumeurs qui s'ont formées par engorgement, doivent être simplement ouvertes, lorsque la matière qui les produit peut facilement s'échapper par la supuration, comme il arrive dans les Tumeurs sanguines; au contraire lorsque la matière s'indurcit au point qu'elle devient incapable de mouvement et de supuration, ainsi que cela se remarque dans la plupart des lymphatiques, elles doivent être extirpées. Appliquons maintenant ces principes généraux aux différentes Tumeurs sujettes à la proposition, et tâchons de les confirmer par les preuves de la plus fidèle expérience, et par celles de la raison.

Tant que les membranes des artères conservent leur union et leur force, elles forment une mutuelle résistance aux efforts du sang qui les parcourt, mais lorsque par quelque cause que ce soit, quelques-unes des tuniques de ce vaisseau sera divisée, celle qui reste n'aura plus une action égale au mouvement du sang, et sera par conséquent obligée de céder proportionnellement à la force de ses impulsions, alors elle s'étendra à chaque pulsation, elle s'élèvera en bosse et formera une poche dans laquelle le sang s'arrêtera, et dont le volume soutiendra son extension; cette Tumeur sera accompagnée de battements, elle obéira au toucher, et la peau conservera sa couleur naturelle, c'est ce qu'on appelle **Anévrisme vrai**. Lorsqu'au contraire toutes les membranes de l'artere seront ouvertes, alors le sang s'écoulera, se répandra dans l'intervalle des parties et produira une Tumeur connue sous le nom d'**Anévrisme faux**, qui sera d'une couleur livide, dure, inégale, et dans laquelle on ne sentira qu'un battement très obscur. Enfin lorsque les membranes de la veine deviendront plus faibles, ou que le sang sera disposé à s'arrêter entre deux valvules, pour l'empêcher de passer, les membranes céderont au mouvement du sang, qui s'arrêtera et



10 11
formeront une Tumeur mole, d'une couleur noirâtre et d'un —
batement sensible, qu'on appelle Varice.

Lorsque le Chirurgien à inutilement employé tous les secours
que lui fournissent la Pharmacie et le Taxis pour réduire les —
Anévrismes vrais, son intention doit être alors d'arrêter par la ligature
du vaisseau le progrès de la Tumeur, dont l'augmentation plus —
considérable, rendrait à la suite l'entreprise plus dangereuse: A cette
intention il joint encore dans le faux Anévrisme, le dessein de vider le
sang épanché par la rupture du vaisseau, dont le séjour constant ferait une
compression, qui seroit bientôt suivie de la Gangrène, ou le disposeroit
à une fermentation capable de produire de dangereux accidens: Enfin
dans les Varices les vus étant simplement de vider le sang arrêté,
et de redonner du ressort aux membranes dilatées, lorsque les remèdes les
mieux indiqués et les compressions sagement pratiquées, n'ont pu remplir
cette dernière intention, on juge dans l'un et l'autre de ces cas, que la
simple ouverture suffit pour remplir les dessein, et l'on n'a besoin
que de la raison pour sentir que l'extirpation alors porteroit avec
elle un danger plus considérable, que celui de la perte de substance, et de
la violence de la douleur, tel que seroit l'hémorragie, dont on auroit —
beaucoup de peine à se rendre le maître, parceque la destruction d'une
bonne partie du vaisseau, que causeroit l'extirpation, pourroit en
rendre la ligature plus difficile, et quelque fois même la compression,
si nécessaire pour la formation de ce caillot, que beaucoup d'expériences
ont fait reconnoître pour la principale cause de la cessation de l'écoulement
du sang, et de la réunion du vaisseau.

Il n'arrive que trop souvent que les violences extérieures brisent
et déchirent les vaisseaux, alors le sang s'épanche dans l'intervalle des
parties et forme une Tumeur plus ou moins dure, d'une couleur noire
et plus ou moins sensible connue sous le nom de Contusion: Quoiqu'on
n'ait rien à craindre dans cette espèce de Tumeur, du mauvais caractère

de la liqueur engorgée, ou épanchée, il faut cependant lorsqu'il y a beaucoup de sang extravasé, ou que le désordre de la partie anome, que l'action des résolutifs ne pourra faire transpirer la liqueur épanchée, ni le remettre dans le commerce des liqueurs, il faut diriger simplement ouvrir la Tumeur, afin de vider le sang extravasé, de prévenir les désordres de la fermentation, et de s'étendre les solides prêts à tomber dans un crétisme qui augmenteroit le danger, et que l'extirpation rendroit encore plus périlleux, soit par rapport aux douleurs que causeroit une perte de substance aussi grande que celle qu'on seroit quelques fois obligé de faire si on l'entreprenoit, soit à cause de l'hémorragie qu'il en arriveroit. voir le cleve p. 180

Nous avons vu que le sang en quelques fois forcé de s'engager dans les vaisseaux lymphatiques, soit par rapport à la quantité, soit par l'obstruction des tuyaux, ou par la rapidité de son mouvement; alors lorsque l'obstruction n'est point parfaite, le sang jette par les tuyaux au delà de leur borne naturelle et circule toujours dans leurs cavités quoique son mouvement plus pénible et plus forcé que d'ordinaire, par conséquent il produit une Tumeur peu élevée, mais beaucoup étendue, et dont la couleur est ^{son} rouge citriné, et la douleur brûlante et piquante; c'est ce qu'on nomme Erysipèle, dont les anciens ont fait une espèce de Tumeur particulière, absolument différente du Phlegmon, mais qui n'en diffère cependant, que par ce qu'elle en est toujours le commencement: De sorte qu'à mesure que l'obstruction devient plus parfaite, les liqueurs s'engorgent de plus en plus, cessent de passer d'un tuyau dans un autre, ce qui augmente le volume de la partie à proportion de leur accumulation, et forme une Tumeur qui s'étend beaucoup dans la profondeur, qui est très tendue, d'une couleur d'un rouge foncé, et dans laquelle il se fait sentir une douleur pulsative, alors on la nomme Phlegmon.

Une fois convaincu de ces vérités on jugera facilement que l'Erysipèle se guérit le plus souvent par la résolution et qu'alors

12 13
ce n'est plus une Tumeur sujette à la proposition

Pour décider précisément sur le traitement des Tumeurs phlegmoneuses, par les opérations de Chirurgie, il est à propos de les considérer dans deux points de vues différents, quoique dans l'un et l'autre, l'ouverture seule puisse y convenir. D'abord ce n'est qu'un engorgement sur lequel l'action des topiques peut avoir lieu; mais, dès lors que cette espérance est détruite, soit par l'abondance des liqueurs qui force extrêmement le tonus des solides, soit par leur malignité qui y cause des irritations, qui les jette dans un éréthisme qui étouffe totalement les routes du sang et des esprits, alors il survient des accidens très fâcheux, ce l'on ne peut prévenir les malheurs de la Gangrène qu'ils annoncent, qu'en ouvrant la Tumeur sans attendre la coction de la matière, et cela afin de débarrasser promptement les solides dont l'étranglement peut porter le désordre plus loin qu'au lieu affecté, et de vider les liqueurs dont le volume et la fermentation sont très à craindre.

Ces cas sont rares, et il arrive plus souvent, lorsque les liqueurs encore engorgées, ne peuvent ni transpirer, ni se remettre sous les loix de la circulation, qu'elles parviennent à une fermentation qui les change en pus, brise les vaisseaux et donne lieu à leur épanchement qui forme une Tumeur nommée par les Arabes écharde, et que nous appelons Abcès, défigurée non seulement par la cessation des accidens, mais encore par l'élevation de la Tumeur en forme de pointe, quelques fois par la blancheur de cet endroit, et presque toujours par la fluctuation que l'on ressent; Alors il n'y a plus d'espérance de résolution et l'on se trouve forcé d'ouvrir la Tumeur si l'on veut éviter les dangers du séjour de la matière de la matière, qui

13
Doit miner la substance de la partie et qui peut y produire des ulcères
caverneux et fistuleux, et si l'on veut préserver le malade des défordres
que produiroient son retour, dont la fièvre seroit le moindre de tous.

Tout pressant que soit le secours que demandent les Tumeurs que je
viens d'assigner, elles ne doivent cependant être que simplement ouvertes,
soit pour donner du large aux parties étranglées, ou pour évacuer la
matière contenue ou épanchée, dont le caractère la dispose à sortir
aisément lorsqu'elle s'est répandue dans ~~l'intérieur~~ des parties les
interstices des parties, et à s'échapper facilement par la supuration,
quoiqu'encre renfermée dans des tuyaux; soit parcequ'elles occupent
beaucoup d'étendue, qu'elles sont garnies pour l'ordinaire d'une grande
quantité de vaisseaux sanguins, qu'elles sont extrêmement sensibles, et
que les solides ne souffrent que le défordre de l'extension, qui se repare
presque de lui même, lorsque le sang s'est échappé par la supuration;
et si peu éclairé que l'on soit, on doit sentir combien seroit alors
dangereuse l'extirpation, tant parcequ'elle causeroit une perte de
substance difficile à reparer, qu'enqu'elle augmenteroit les douleurs
dont le malade est déjà assailli, et qu'il seroit difficile d'arrêter une hémorragie
difficile à arrêter.

Lorsque les liqueurs qui produisent les Tumeurs dont je viens de
parler, ont entièrement perdu leur disposition naturelle, elles
forment d'autres espèces de Tumeurs, que l'on appelle dégénérées,
annoncées par une couleur plus ou moins rouge, dans la circonférence,
noire dans le centre, souvent ouvertes en plusieurs endroits, et
accompagnées d'une chaleur brûlante et de douleurs déchirantes, telles que
sont les Charbons et les Anthrax. Ces liqueurs ainsi dégénérées ne sont
pas plutôt fixées dans une partie, qu'elles en altèrent considérablement
les solides par leur malignité, et s'engagent de manière dans leur

14 1/2
Substance qu'elles forment ensemble un tout incapable d'une vraie —
Suppuration. Lorsque ces Tumeurs occupent une grande étendue, que
l'inflammation qui les accompagne se continue beaucoup au delà de la
circonférence de la Tumeur, et qu'elles intéressent des parties à respecter,
il faut alors simplement les ouvrir, même dans leur naissance, et de
plusieurs ouvertures assez profondes, afin de diminuer l'étranglement des
solides, ~~et~~ de procurer l'issue d'une matière, dont le séjour constant —
entraîneroit la mortification, et dont le retour feroit absolument périr le
malade, et de permettre aux remèdes alexipharmaceutiques que l'on y applique
à dessein de ranimer le ressort des solides et le mouvement des fluides, de
pouvoir les pénétrer.

Mais dès lors que ces Tumeurs ne se trouvent point dans les —
circonstances que je viens de désigner, il est d'expérience, que —
l'extirpation est préférable à l'ouverture simple, sur tout lorsque les
progrès rapides de la Tumeur et la violence de ses acideurs, annonçant la
mortification, et que la fièvre ardente, les nausées et les mouvements —
convulsifs nous désignent la contagion, parce que la simple ouverture
laisse languir la plupart des sucs, dont le mauvais caractère détruit —
totalement les parties solides primitivement affectées, et porte le désordre
successivement de partie en partie: au lieu que l'extirpation arrête
plus facilement ces tristes acideurs, parce qu'elle emporte non seulement
les solides dans vie, ainsi que les humeurs fixées dans la partie, que des
faiblesses continuelles forment souvent de rentrer dans le commerce des —
liqueurs, qu'elles achèvent d'infecter, mais encore ouvre une voie à une
ample suppuration, qui entraîne également les mauvais ^{et les vains} repandus dans
tout le corps, et ceux qui sont encore engagés dans la partie.

Il n'est point de Chirurgien, qui ignore que les Tumeurs sont
des Tumeurs phlegmoneuses, et tous savent qu'elles doivent leur —
naissance à l'engorgement de quelques vaisseaux lymphatiques; —

cependant ils ne doivent être que simplement ouverts, parceque cet engorgement de vaisseaux lymphatiques étant promptement suivi de celui des vaisseaux sanguins, la limphe s'échauffe et suppure facilement, par le mouvement que lui communique la chaleur du sang; et l'extirpation n'y convient nullement, tant par rapport à la perte de substance de la tumeur, que parceque les solides peu endommagés, reprennent facilement leur premier état après la supuration, excepté que le trouble ne soit marqué au coin fatal du Charbon et de l'Anthrax.



Nous avons vu qu'il y a encore une Tumeur également causée par le sang que par la limphe, produite par la transformation des sucs nourriciers en une substance solide, qui prolonge les parties, ou qui en forme de superfluités, telles que sont les Polypes, Sarcomes, Condilomes, Porreaux &c, et dont les consistences sont différentes, par rapport à la disposition des sucs nourriciers, disposés tantôt à former une substance membraneuse, tantôt une chaire fungueuse, et tantôt une substance calcaire. Toutes ces Tumeurs en général doivent être extirpées, pourvu qu'elles soient guérissables; parceque cette opération en détruit jusqu'à la racine, par conséquent les sucs ne trouvant plus de routes, ni de moules, où ils puissent ainsi se transformer, il est presque impossible, que l'on arrête les progrès de la Tumeur, et qu'on n'en empêche la récidive, sur tout lorsqu'on a précédemment par l'usage des remèdes convenables, détruit la disposition des sucs à cette transformation, et que la Tumeur ne doit en quelque façon sa formation qu'au seul changement des solides, par quelque cause externe; au lieu que la simple ouverture, non seulement ne peut détruire qu'imparfaitement cette disposition des solides à recevoir un accroissement contre nature; mais encore, les douleurs qu'elle cause déterminent les liqueurs à y couler plus rapidement, ou pour mieux dire, elles produisent un exétisme dans les solides, qui

1617
étrangle les cavités des tuyaux, et retient les liqueurs qui s'y présentent, ce qui fait que la Tumeur augmente de plus en plus, et prend même un caractère plus fâcheux; par lequel cette simple division sans détruire entièrement ces moules, change seulement l'ordre du mouvement qui se passe entre le solide et le fluide de la Tumeur, et par conséquent le fluide dans ce nouveau mouvement se transforme souvent (ainsi que l'expérience la fait remarquer) en une liqueur capable de rendre la Tumeur cancéreuse.

Quoique à parler généralement, on doive donner la préférence aux moyens les plus doux, l'art se trouve souvent obligé de s'écarter de cette loi, pour procurer un plus grand bien: C'est ainsi par exemple, que la Chirurgie est souvent forcée d'extirper des Tumeurs, lorsqu'elle prévoit que leur simple ouverture, est plus capable d'entretenir leurs désordres, que d'en procurer une prompte guérison. Nous venons de voir effectivement, que dans la plupart des Tumeurs sanguines, elle a donné la préférence à la simple ouverture, à cause de leur sensibilité, et de la facilité avec laquelle l'humeur suppure, pour peu qu'il s'y mêle quelque liqueur hétérogène: Nous allons voir à présent, qu'elle préfère souvent l'extirpation à la simple ouverture dans la plupart des Tumeurs lymphatiques, tant parce que la lympe ne ferme que difficilement, que parce qu'elle ne se détache qu'avec beaucoup de peine des parties avec lesquelles elle a contracté quelque adhérence.

La nécessité qu'il y a que la lympe se distribue dans les parties, pour se transformer en leur propre substance, et y laisser la matière de quelque éréction, la engagée dans une circulation particulière, que la disposition de ces parties à s'accrocher et à perdre leur mouvement, lui auroit bientôt fait cesser de continuer, si elle n'eût été mêlée avec une humeur plus fluide et plus coulante, connue sous le nom de sérosité, qui lui sert de véhicule, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue au pore où elle doit s'engager pour nourrir le solide, par conséquent elle peut produire des

Tumeurs d'un caractère essentiellement différent, et qui demandent un traitement particulier.

Toutes les Tumeurs que la lympe et la serosité produisent, peuvent se réduire sous trois genres différents. Le premier comprend toutes celles que la lympe seule peut causer, en s'arrêtant dans ses propres tuyaux, soit qu'elle s'y endurisse, ou qu'elle y acquière quelque autre degré de consistance, alors nous les nommons proprement lymphatiques. Le 2^e renferme celles que la serosité seule produit, soit qu'elle s'arrête dans les vaisseaux lymphatiques, ou qu'elle s'épanche dans quelque capacité, celles cy sont appelées seruses. Le 3^e contient toutes celles que ces deux liqueurs mêlées ensemble peuvent occasionner, soit qu'elles sejourner dans leurs tuyaux, ou qu'elles se répandent dans leurs intervalles, nous donnons à celles cy le nom de Tumeurs lymphatiques seruses.

Pour ne point tomber dans une énumération ennuyeuse de ces Tumeurs, et les comprendre dans un précis qui ne nous laisse point ignorer les espèces d'opérations que l'on y doit pratiquer, nous réduisons chacun de ces genres de Tumeurs à deux espèces particulières, et nous voyons en général, que les unes et les autres arrivent par engorgement ou par épanchement.

Dans ce dessein nous distinguerons deux espèces de Tumeurs lymphatiques proprement prises; l'une dans laquelle la lympe s'en endurec dans tous les vaisseaux d'une glande, et forme une Tumeur dure et presque insensible, que l'on appelle squirre: L'autre est celle où la lympe se trouve renfermée dans une poche particulière nommée Kiste, d'où elles ont tirées leurs dénominations de Tumeurs enkistées. Nous rangerons de même les Tumeurs seruses, sous deux espèces, dans la première la serosité s'arrête dans quelque vaisseau lymphatique, elle se dilate par son accumulation, et forme une Tumeur molle, transparente et insensible qu'on nomme Hydride, laquelle au sentiment de Schenkiius liv. 3^e et de Platerus. p. 596 est presque toujours le précurseur de l'Hydropisie: Et dans la 2^e la serosité par son volume ouvre les vaisseaux, s'épanche dans quelque partie, et produit une Tumeur dont le volume

18 19
augmente à proportion de l'accumulation de la sérosité, et du degré d'extension des parties, où elle se répand, la couleur en est d'ordinaire transparente, et l'on y ressent une inondation, alors cette Tumeur porte le nom général d'Hydropisie. Enfin les Tumeurs lymphatiques sereuses peuvent arriver en deux manières, 1^o lorsque la lymphe et la sérosité proportionnellement mêlées ensemble, s'arrêtent dans les tuyaux, les gonflent, et produisent une Tumeur môle, peu sensible et qui ne revient que lentement dans son premier état, lorsqu'elle a été pressée. 2^o lorsque la sérosité surabondante, passe (à cause de la délicatesse de ses parties et de leur mouvement indéterminé) à travers des pores des tuyaux et tombe dans leurs intervalles, alors elle forme une Tumeur môle, peu sensible, d'une couleur plus transparente, et qui revient plus facilement sur elle-même que la première, dans l'un et l'autre cas, ces Tumeurs portent le nom d'Œdème, et il n'y a que lorsqu'elle occupe la plus grande partie du corps, qu'il en passe en usage de la nommer anasarque. voirs Et Mueller prat. de med. p. 696

Après cette distinction des Tumeurs lymphatiques, il est de l'ordre que je me suis prescrit, de prononcer sur leur traitement. Dans cette ce dessein (crainte de fatiguer le lecteur par la sèche de mon style) je me trouve obligé de renfermer d'abord dans des règles générales, la méthode qu'il faut suivre pour les traiter, et pour le faire avec précision, nous établirons les maximes suivantes.

1^o toutes les fois que la lymphe s'est endurcie, soit par sa propre disposition, ou par celle que des souchures grossières, ou des acides lui ont communiqué, sur tout lorsqu'elle a vieilli dans cet état, alors il est très difficile, que l'action des remèdes puisse la liquéfier et la faire supurer, par conséquent la Tumeur ne peut se guérir, que par l'extirpation, de cepté qu'il n'y survienne inflammation.

2^o lorsque la lymphe est renfermée dans un kiste, et qu'elle reçoit par une de ses parties la matière de son accroissement, elle ne peut être radicalement guérie, que par l'extirpation. La Tumeur peut

3^o quand la lymphe est mêlée avec la sérosité, ainsi qu'il arrive dans l'Œdème, Leucophlegmatie et Anasarque, elle ne peut point

12
contracter de fortes adhérences, et elle peut facilement s'écouler par une simple ouverture, il en est de même lorsque la sérosité seule s'est épanchée dans quelque capacité.

Cependant pour rendre précisément raison de ces principes et les confirmer par l'expérience, je prie qu'on me permette d'en faire une application aux Tumeurs principales dont il est question, et pour le faire avec ordre je commencerai par le Squirre.

Quiconque voudra décider avec précision sur le traitement des Tumeurs squirreuses, doit les considérer dans différents points de vues; car ou elles dépendent de la seule action languissante des Solides, qui ne peut pousser la Lymphe d'une partie dans une autre, à cause qu'elle a été affaiblie par quelque violence extérieure, alors nous nommons la Tumeur squirre simple; ou elles sont causées par une Lymphe pénétrée de quelque vice particulier, qui la dispose à se fixer et à se durcir, et dans ce cas nous les appelons Squirres malins: Enfin aux unes et autres de ces Tumeurs, il peut survenir inflammation, et pour lors nous leur donnons le nom de Squirre dégénéré ou composé.

Quoique dans le squirre simple, la Lymphe se soit beaucoup endurcie, et qu'elle semble avoir formé par ses adhérences avec les Solides une substance presque incapable de mouvement ni de supuration, cependant l'expérience nous en fournit d'heureuses guérisons dans leur commencement par l'application des résolutifs et quelques fois mêmes des suppuratifs par la supuration, et alors la seule ouverture les a parfaitement guéris; lorsqu'au contraire la Tumeur aura vieilli, qu'elle sera devenue susceptible de douleur, telle légère qu'elle soit, et quand même elle seroit insensible, il est dangereux de s'opiniâtrer à vouloir en procurer la résolution, ni la supuration, et il n'est point de Chirurgien, qui ne s'aie que de pareilles entreprises, ont fait dégénérer la Tumeur en cancer, ainsi que lorsqu'on s'est contenté de se soigner simplement, parce que cette division ne pouvant point évanescer


2021
une humeur qui a perdu son mouvement; elle ne sert qu'à exciter quelques ébranlemens dans les parties sensibles de la Tumeur, par lesquelles cette tumeur n'auroit que peu d'action, qui produisent un mouvement dans cette humeur qui la fait fermenter, en exaltent les sels et les rendent capable de ronger la partie et d'y produire des desordres fâcheux; par conséquent il n'y a alors que l'extirpation, qui puisse guérir radicalement la Tumeur, par laquelle emporte totalement l'humeur fixée, ainsi que les solides comme pétrifiées et hors d'état de recouvrer leur première disposition.

Cependant lorsque le volume d'une Tumeur squirreuse gêne l'action des parties qui l'avoisine, alors le cours du sang embarrassé par cette compression, se force en passage dans les vaisseaux lymphatiques, et enflamme la Tumeur, pour lors la fermentation du sang échauffe la matière lymphatique, la fonde et la fait supurer: Dans ce cas la simple ouverture peut avoir lieu, et il est même de la prudence du Chirurgien de la retarder jusqu'à un certain point, que lui seul peut connaître, afin que tout le corps squirreux se fonde et supure, pourvu que l'humeur qui produit la Tumeur, ne soit infectée de quelques mauvais levains, car dès lors qu'on le soupçonne comme dans les Bubons vénériens et pestilentiels, il faut à la moindre apparence de supuration, l'ouvrir, étant plus prudent de tomber dans la nécessité d'extirper la glande, que d'exposer le malade aux desordres d'une délitescence, qui lui donneroit la vérole, ou qui pourroit le faire périr en peu de temps.

Outre les levains véroliques et pestilentiels, il en est encore de qui peuvent infecter la lymphe, la disposer à s'arrêter dans les corps glanduleux, et d'y former des Tumeurs que nous avons déjà nommées Squires malins, tels sont les vices syrophuleux, chancreux et scorbutiques. Or si dans les Squires simples, on a quelques fois lieu d'appréhender les suites du mouvement de l'humeur fixée, par l'indiscrete application des résolutifs et des supurans, ou par l'ouverture mal ordonnée de la

21
0
Tumeur, et que les Solides ne puissent pas se rétablir dans leur premier ordre, combien ne doit ~~pas~~ on pas craindre l'un et l'autre dans ces dernières Tumeurs, et si la crainte arrête quelques fois le Chirurgien dans les premières, quelles précautions ne doit elle pas lui faire prendre dans celles cy; c'en est que je vais examiner.

Les Tumeurs serpyguleuses doivent leur naissance à une lymphe épaissie par des acides, qui en arrêtent le mouvement dans les glandes extérieures, car ce n'est qu'alors quelle forme des Tumeurs sujettes à la propagation, puisque lorsque les glandes intérieures s'en trouvent fâchées, rarement peut on opérer avec succès les Tumeurs quelle forme extérieurement. Pour prononcer sur cette espèce de Tumeur, il faut faire attention que les acides qui épaississent la lymphe, peuvent devenir corrosif dans leur séjour, ou lorsqu'on en excite mal-à-propos le mouvement, d'où l'on peut inférer, que ce levain n'est pas seulement capable d'épaissir la lymphe, de la fixer dans une partie et de l'obliger à contracter des portes adhérentes, mais encore de transformer les Solides en une substance, qui ne peut plus recevoir une nourriture conforme à son état naturel; Or on juge dans ces cas de l'inutilité des résolutifs et des suppurans, et même de leur danger, ^{du} ^{que causeroit} lorsque leur application ~~est~~ mal concertée; ainsi que de celui que produiroit de la simple ouverture, plus capable d'augmenter les désordres de la Tumeur par les douleurs quelle excite, que d'en tarir la source; c'en est que l'expérience m'a fait remarquer dans plusieurs cas, où la simple ouverture a fait dégénérer la Tumeur en un ulcère, dont on ne pouvoit arrêter les progrès et qui se remplissoit toujours d'un champignon qu'on ne consommait inutilement: On peut donc conclure sur la raison et l'expérience, que tant que les vaisseaux lymphatiques vicieux subsistent, qu'ils reçoivent toujours une nouvelle matière qui augmente les progrès de la Tumeur, par conséquent que ce n'est qu'en détruisant par l'extirpation jusqu'à la racine de ces vaisseaux dérangés, et en les fermant par une bonne cicatrice, qu'on peut en obtenir une guérison parfaite et en empêcher la récidive, ainsi que le dit Galien l. 14 de la meth. ch. 11.



22 22

Dans quelque situation que soit le Cancer, c'est-à-dire, quoiqu'il ne soit que la suite d'un squirre simple, ou qu'il dépende immédiatement d'un vice chancreux on doit toujours le considérer, lorsque la Tumeur dure, ronde, inégale, d'une couleur livide, extrêmement sensible et parsemée de veines variqueuses, anome quelle est réellement canceruse, on doit ~~se~~ dis-je le regarder comme une Tumeur formée par une limphe pénétrée d'un acide corrosif, qui se transforme avec les solides, en une masse que la supuration, ni l'ouverture ne peuvent point emporter. Par conséquent quoi que quelque fois cette Tumeur, n'annonce rien de mauvais dans son commencement, à cause que ces levains encore embarrassés dans les parties pateuses de la femphe, n'ont point d'action sur les solides, il faut s'en défier, et ne point hasarder sur de tels présages, les résolutifs, les supurans, ni ~~d'ouvrir~~ l'ouverture, puis que l'expérience nous confirme que les uns et les autres de ces moyens augmentent les progrès de la Tumeur, et qu'ils en multiplient infiniment les accidens, ^{en agassant les solides, ou} soit par le mouvement qu'ils excitent dans les ^{humeurs} ~~solides~~, ou ~~en agassant les~~ solides; nous pouvons donc conclure soit que la Tumeur se trouve dans cette dernière circonstance, ou que les événemens affreux la déclarent positivement chancreuse, que puis qu'elle dépend d'une humeur si à craindre, et d'une transformation des solides en une substance qui ne peut se résoudre ni supurer, qu'il faut absolument extirper l'une et l'autre, parce qu'on emporte par là non seulement l'humeur ^{fiée}, mais encore la masse insupurable, dont il ne peut rester la moindre partie, quelle ne devienne le germe d'une seconde Tumeur, tel est le sentiment d'Aquapendente p. 18.

Par quelque cause que ce soit que la limphe vienne à perdre de son mouvement, et qu'elle s'arrête dans une glande, ou dans quelque vaisseau lymphatique, il arrive souvent que la serosité s'en sépare, et qu'elle s'insinue dans le tissu de ces parties, alors elle mouille et relâche les membranes, leur donne lieu de se dilater, et de former une poche qui renferme la matière qui s'y amasse, l'est ce qu'on nomme communement Loupes, Les Chirurgeois les connoissent sous le nom de Tumeurs enkistées.

La lympe ainsi renfermée, acquiert différens degrés de consistance; soit parceque la serosité qui lui sert de véhicule, ne s'échappe point entièrement, ou parceque le mélange de quelque autre humeur particulière, la dispose à une fermentation capable de les lui communiquer, et de là viennent les noms de *Skatome*, d'*Althérome* et de *Mélicéris*, que les anciens ont donné à ces Tumeurs, à cause de la ressemblance, que la matière qu'elles contiennent a avec du Suif, de la Boiillie, et du miel. Toutes ces Tumeurs reçoivent par l'extrémité des vaisseaux lymphatiques engorgés, la matière de leur accroissement, par conséquent elles ne peuvent point se guérir par la simple ouverture, parcequ'elle ne peut point détruire le Sac, ni la source de l'humeur qui le remplit, ce qui fait que la Tumeur se reproduit après l'évacuation de la matière contenue, et que le malade après avoir essuyé les douleurs d'une opération inutile, et la fatigue d'un nombre de pansements infructueux, ne se trouve pas moins incommodé: C'est ce que j'ai remarqué à la simple ouverture d'une Loupe qu'une jeune fille portoit à la cuisse, laquelle se remplissoit de jour à autre, lorsqu'une partie de l'humeur s'étoit évacuée, par un petit trou fistuleux qui étoit resté à l'endroit de l'ouverture. Sur cet exposé on peut prononcer que toutes les Tumeurs de cette nature doivent être extirpées, puisque par cette opération, on détruit la source de l'humeur, et qu'on emporte le Sac qui lui sert de retraite. voir

deechamp 1. 36. p 190 Lorsque le cou de la lympe et de la serosité est ^{valenti} interrompue dans les vaisseaux lymphatique de la peau et de la graisse, elle s'arrête dans leurs cavités, et alors la serosité s'infiltre souvent dans le tissu de ces parties, ce qui donne lieu à une élévation môle, blanche et peu sensible, que nous avons déjà nommé *Edème*. Cette espèce de Tumeur pour l'ordinaire, se termine par la résolution, et elle n'est sujette à l'opération que lorsque son volume trop considérable, force l'étendue de la peau à transer les vaisseaux sanguins et fait appréhender la mortification, alors il suffit d'ouvrir la Tumeur dans une ou plusieurs de ses

parties, quoique presque toujours dans la plus déclive, soit à dessein de
dessein de diminuer l'étranglement de la peau; ou de faire écouler les
liqueurs enorgées et infiltrées, et on juge par la fluidité que la lymphé
et la serosité courent lorsqu'elles sont mêlées ensemble, qu'elles
peuvent facilement s'échapper par la simple ouverture de la Tumeur,
dont l'extirpation seroit mortelle le plus souvent, à cause de la perte
de substance qu'elle produiroit alors.

Dès que la serosité vient à surabonder, elle porte nécessairement
le diamètre de quelque vaisseau lymphatique au delà de son étendue
naturelle, et se force à s'écouler, alors la serosité se repand dans
quelque capacité, et son accumulation forme une Tumeur qu'on
nomme en général **Hydropisie**, mais qui reçoit différentes
dénominations, selon les parties qu'elle occupe, ainsi on la nomme
Hydrocéphale à la teste, **Hydropisie** de poitrine lorsqu'elle la serosité
se repand dans cette partie, **Ascite**, au bas-ventre et **Hydrocele**
lorsqu'elle occupe le scrotum.

Soit que la serosité se repande dans les parties intérieures de
la teste, où elle se niche quelques fois entre le crâne et la dure
mère, ou entre la dure et pia mère, et d'autres fois dans la substance
même du cerveau; soit qu'elle inonde les parties qui recouvrent le crâne,
elle est toujours nommée **Hydrocéphale**: Cependant le sort de l'une
et l'autre est très différent, puisque lorsque ce déluge est au dessus du
crâne, on ne peut s'en affrayer que par le tumolement, la bouffissure du
visage, et la rapidité du malade, signes fort équivoques, et sur lesquels
on ne peut hasarder l'ouverture du crâne par le trépan, remède incertain,
mais qui pourroit avoir quelque succès si les eaux étoient seulement
repandues entre le crâne et la dure mère, ou entre celle cy et la pia
mère; il n'en est pas de même lorsque la serosité baigne la serosité
s'épanche dans les parties extérieures, où elle forme une Tumeur mole
transparente et quelques fois avec inondation, l'expérience a fait
remarquer alors, qu'une ouverture pratiquée à la nuque, ou plusieurs

scarifications faites ici et là dans toute l'étendue de la Tumeur, l'ont quelque fois heureusement terminée, contre le sentiment de Hildanus cent. 3. obs. 17^e et de Fabrice d'Acquapendente 2 part. p. 571.

Quoi que l'épanchement de sérosité dans la poitrine, ne produise que rarement une Tumeur, et que par conséquent cette maladie semble n'être point sujette à la proposition, je dirai cependant soit qu'il s'y remontre des signes qui nous annoncent cet épanchement, sans élévation, soit qu'il s'y fasse une Tumeur qui nous l'indique, quelle ne doit être que simplement ouverte, ainsi que lorsque cela arrive par quelque autre matière.

Tous les épanchemens de sérosités dans le bas-ventre, qui forment cette Tumeur nommée Ascite, soit que la sérosité soit répandue dans les parties, ou qu'elle se trouve renfermée dans les bornes d'un Kiste, ne sont susceptibles que d'ouverture, (qu'Emasistrate avec peu de raison, n'osoit entreprendre) ce qui en même suffisant pour remplir les intentions du Chirurgien, dont le seul dessein est au moins de prolonger les jours du malade par l'évacuation de la sérosité, dont l'accumulation jusqu'à un certain degré le feroit certainement périr, laquelle à cause de sa fluidité s'écoule facilement par cette ouverture, ainsi sans entrer dans un détail de raisons pour rejeter l'extirpation de ces Tumeurs, la nature des parties où elles se forment d'ordinaire, sont trop respectables pour oser l'entreprendre.

Pour terminer cette première partie il ne me reste plus qu'à dire quelque chose, sur le traitement de l'Hydrocele, par laquelle on entend, un amas de ~~serosité~~ sérosité dans le scrotum, soit qu'elle s'épanche dans la tunique vaginale du testicule, ou dans le dartos, ou qu'elle s'infiltre dans le scrotum. Lorsque la sérosité est simplement infiltrée, souvent la Tumeur se guérit par le seul secours des résolutifs, ou par une simple ouverture, que l'on fait à chaque côté des bourses; mais dès lors que la sérosité est épanchée, il faut ouvrir la Tumeur afin de l'évacuer, et l'extirpation ne sauroit y convenir, excepté qu'il n'y eût un Kiste particulier, encore cela demanderoit il des attentions très exactes, qui ne peuvent se trouver que dans un Chirurgien expérimenté; et ainsi que nous le verrons dans la 2^e partie de cette dissertation, en examinant les moyens dont il faut se servir, pour l'ouverture ou extirpation des Tumeurs, que nous venons d'assigner.

2627

Quels sont les cas, où le Caustique est préférable à
l'Instrument tranchant, et les raisons de préférence.

Après avoir démontré par les lumières de la raison et les règles de l'expérience, les Tumeurs qu'il faut ouvrir ou extirper, il est d'ordre que je me suis proposé, d'examiner à présent, les cas où l'on doit se servir de l'un ou de l'autre par préférence de l'Instrument, ou du caustique, dans l'ouverture ou l'extirpation des Tumeurs.

Il n'est pas hors d'œuvre de dire icy qu'on entend par Instrument tranchant, tout ce qui peut diviser et séparer nos parties à l'instant même de son application, et que le nom de Caustique est également propre à signifier un fer ardent, dont les Chirurgiens François ne se servent plus que pour les maladies des os, comme à exprimer un médicament dont les parties sont propres à faire division dans nos parties molles, en les rongant et en y faisant escave, lorsque notre propre chaleur en a développé les parties, et dont l'effet se produit plus ou moins promptement, à proportion de l'activité des parties de ce médicament.

Sans m'assujétir aux décisions de l'antiquité, ni à la pratique de certains empiriques, qui publient hardiment les effets merveilleux du caustique, moins par des heureux succès, que parce qu'ils peu instruits de la structure des parties, ils n'ont, non sans raison, se servir de l'Instrument, qu'un Chirurgien éclairé, porte sans danger dans les Tumeurs, ainsi que l'ont fait ces fameux Médecins, qui ont fait gloire de manier de l'Instrument, et qui peu instruits de l'honneur de la Chirurgie, n'ont pas été la foiblesse d'Avicenne et de bien d'autres, qui affectent ^{général} plus de la mépriser parce qu'ils l'ignorent entièrement, que parce qu'ils ne peuvent en supporter l'éclat; je vais donc examiner, quels peuvent être les avantages du caustique, et ceux de l'Instrument.

Généralement parlant, l'Instrument porte plus l'effroi dans les esprits faibles et délicats, qu'il n'est pour l'ordinaire dangereux dans l'ouverture, ou l'extirpation des Tumeurs, lorsqu'il est conduit par une main expérimentée, cependant il est certaines Tumeurs, où les succès sont moins heureux, que ceux du caustique, telles que sont les

lymphatiques, qu'on est obligé de simplement ouvrir, par les apparences d'une suppuration, sur tout, lorsque la Tumeur n'est ni douloureuse, ni enflammée; c'est le sentiment de Paré l. 21. chap. 52. p. 729. et de Dionis. p. 692.

L'instrument tranchant a encore ces avantages 1°. c'est qu'on ménage les parties autant qu'on le juge à propos. 2°. on fait l'ouverture *proportion* proportionnée au volume de la Tumeur, et à la quantité de la matière arrêtée, ce qui fait qu'étant évacuée sur le champ, on n'a plus à craindre les dangers de son séjour ni de son retour. 3°. les coupes de l'instrument tranchant étant plus régulières que celles de caustie, elles ne sont point suivies de ces contorsions des tujaux, qui retiennent les sucs, ce qui fait que la suppuration s'y établit plus promptement, par conséquent les sucs encore retenus dans les tujaux s'en échappent bien plus vite, sur tout si ce sont des Tumeurs sanguines. 4°. son action étant promptement finie, la longueur de la douleur, ne peut point porter le trouble dans les autres parties, ainsi qu'il arrive souvent dans la caustie appliqué mal-à-propos.

Le caustie à la vérité a quelque chose de moins épouvantable pour un malade craintif, que l'instrument, cependant les douleurs qu'il cause quoique moins frappantes, l'emportent toujours par la longueur de leur durée, au dessus de celles de l'instrument. La lenteur de son action comparativement à celle de l'instrument, est encore un puissant motif, qui nous engage à le rejeter dans les cas pressans. La difficulté avec laquelle se sépare l'escarre qu'il produit, nous oblige encore souvent à ne point nous en servir, non seulement parce que cela rend la guérison plus tardive, plus douloureuse, mais ~~et~~ et même la cicatrice plus difforme, mais c'est qu'on est souvent forcé de se servir de l'instrument, selon la remarque de Leclerc p. 358, pour ouvrir et pour en procurer la chute. La crainte des désordres que peut produire le mélange du caustie avec la matière renfermée dans la Tumeur, nous force presque toujours à lui préférer l'instrument.

tranchant. Enfin la difficulté de borner son action, qui s'étend — 28 29
souvent au-delà de ce qu'on veut ouvrir ou enlever, demande des
précautions dans son application qui ne peuvent se trouver que
dans un Chirurgien éclairé et expérimenté, tel est le jugement qu'en
portent Paré L. 19^e. chap. 33. p. 462. et M^r. Garangeot. p. 281.

Sur ce que je viens de dire il n'est point de jeune Chirurgien, qui
ne rejette entièrement le caustic dans la guérison des Tumeurs,
cependant comme il en est des cas, où il a quelque avantage sur
l'instrument tranchant, lorsqu'il est ménagé par un Chirurgien —
qui ne laisse guider que par les lumières de l'art et la bonne foi des
indications, il manqueroit quelque chose au dessein que j'ai formé,
si je n'exposois en peu de mots quels peuvent être ses avantages.
Il a d'abord celui de moins épouvanter le malade que l'instrument,
cependant cet avantage, ne doit engager le Chirurgien à s'en servir,
qu'autant que la connaissance de la structure de la partie, et de la nature
de la Tumeur, lui fait prévoir que l'application du caustic, ne peut
être plus dangereuse que le séjour de la matière, alors on peut accorder
quelque chose à la faiblesse du malade; En second lieu il est constant
que la douleur lente que produit le caustic, excite une inflammation
dans la Tumeur, dont la chaleur est capable de causer la fermentation
de l'humeur lymphatique fixée et par conséquent de la faire supurer,
joint à ce que les parties du caustic sont d'une nature propre à fondre
et liquerifier les liqueurs les plus endurcies.

Pour réduire ces principes en pratique, voici les règles —
générales qu'on peut établir 1^o que dans l'ouverture des Tumeurs
sanguines, l'instrument est absolument préférable au caustic.
2^o que dans toutes les Tumeurs lymphatiques, dans lesquelles la matière,
n'est point parfaitement épanchée, et où elle est par conséquent encore
renfermée dans des propres tujaux, le caustic peut être préféré à
l'instrument, surtout, lorsqu'elle est ^{est} dure, insensible et immobile. 3^o Dans l'extirpation
des Tumeurs sanguines, de même que dans les lymphatiques, qui se sont

enflammées et Devenues douloureuses, et dans celles qui sans ces accidens, ont une base étroite et dans qui ne sont point adhérentes, l'instrument doit toujours être préféré au caustic, excepté dans les Orubons vénériens et pestilentiels, 4°. dans les Tumeurs lymphatiques, dont la base est large, qui ne sont adhérentes qu'à des parties peu respectables, le caustic peut être sans danger préféré à l'instrument, pourvu qu'elles soient insensibles, et qu'elles se trouvent dans les circonstances de guérison.

Pour rendre précisément raison des principes que nous venons d'établir, parcourons les différentes Tumeurs sujettes à la Proposition, dans le même ordre de la première partie de cette Dissertation, et tâchons par des distinctions raisonnables, de mettre cette matière hors de la confusion.

Nous avons vu que toutes les Tumeurs sanguines simples comme les Anévrismes, Varices et Contusions devoient être simplement ouvertes, nous dirons apreset, qu'elles ne doivent absolument l'être qu'avec l'instrument, parceque dans les Anévrismes, on est obligé d'aler doucement, jusqu'à ce qu'on ait découvert l'artere, afin de se rendre maître du sang par la ligature, ce qui n'arriveroit point si on faisoit l'ouverture de la Tumeur avec le caustic, ainsi que le fait observer Paré liv. 8°. chap. 34°. page 164, parcequ'il pourroit porter son action sur l'artere même, qu'il rongeroit sans distinction, et par conséquent la ligature ~~la ligature~~ ne pouvant alors que difficilement être pratiquée, il suivroit nécessairement un écoulement de sang qui feroit périr le malade, sur tout si l'artere étoit considérable: On peut encore dire que la perte de substance que produit l'escare du caustic, ne pouvant être assez promptement réparée pour recouvrir l'artere, et lui former en quelque façon un rempart contre les violentes impulsions que le sang vient y produire avant qu'il se soit tracé une route dans les vaisseaux collatéraux, il en pourroit arriver un nouvel Anévrisme. Il seroit encore à craindre, si on ouvroit ces sortes de Tumeurs avec le caustic, qu'il ne s'en mêlât quelque portion avec le sang, dont la circulation s'entreroit vers quelque autre partie, où il produiroit des desordres très fâcheux. Ce sont les mêmes raisons qui font donner la préférence à l'instrument tranchant dans l'ouverture



des Tumeurs variqueuses; c'en ainsi que le pense Paré liv. 13^e chap. 24^e. 30 31
page 326; demême que scultet table 24. page 230, à l'exemple de Spigélius et Dionis

On doit demême donner la préférence à l'instrument dans l'ouverture
des Contusions, puisque 1^o le sang qui cause ces Tumeurs étant capable de
s'en flammer et d'agiter vivement, deviendrait susceptible d'une
fermentation si violente par son mélange avec les parties du caustic,
qu'elle augmenteroit l'érysipèle dans lequel l'action de ce médicament jette
les solides, et par conséquent produiroit des desordres, qu'on auroit beaucoup
de peine à calmer; et quiconque désirera des autorités sur ce point, n'a
qu'à se donner la peine de lire Paré liv. 12^e chap. 4^e et 5^e, page 192.
et 193. ~~scultet table 24~~ Mais observ. 7^e page 116 et ouvrira dans scultet
sect. 14^e page 131, que lorsque les secours de la Pharmacie ont manqué,
qu'il faut ouvrir ces Tumeurs avec l'instrument. 2^o c'est que les coupes de
l'instrument comme je l'ai déjà dit étant égales, elles ne causent point dans
les solides ces roideurs que produisent le caustic; par conséquent il laisse
écouler sur le champ dans les divisions, les liqueurs épanchées, détruit
l'étranglement des solides, et ne retarde point la supuration du sang encore
engagé dans les tumeurs. Dionis p. 726 et 727, donne demême la préférence à l'instrument

Toutes les Tumeurs d'anguines composées, comme le Phlegmon, doivent
absolument être ouvertes avec l'instrument tranchant, soit que l'étranglement
de la partie, qui nous annonce souvent la mortification, nous force à les ouvrir
avant la coction de la matière, soit que son épanchement après qu'elle est
changée en pus, nous engage à l'évacuer pour prévenir les desordres de son
séjour; parcequ'ailleurs les parties étranglées par la quantité du sang arrêté, ou
par la fermentation, étant très douloureuses, ne demandent qu'à être
simplement divisées pour deux raisons 1^o afin de les relâcher et de les
mettre à leur aise 2^o pour l'évacuation des liqueurs qui les gonflent et les irritent.

On si ^{on} appliquoit alors le caustic, les parties dures, hérissées et
tranchantes les estrangeroient encore plus, et les jetteroient dans une
tension si douloureuse, que l'inflammation et la fièvre augmenteroient,
et la mortification qu'on a dessein de prévenir arriveroit plus
promptement, joint encore que l'escarre que produit le caustic, retardant

31
l'issue d'une matière prompte à fermenter, il se produiroit nécessairement
de nouveaux dépôts dans les environs du premier. Cependant lorsque le
Plegmon réduit en abcès, occupe que les graisses, qu'il n'a voisine point
les artères, les tendons, aponeuroses et la route des gros vaisseaux, et
qu'un malade épouvanté de l'instrument, n'en veut point éprouver
l'action, il vaudroit mieux alors se servir d'un léger caustique, sur-
tout si l'inflammation étoit beaucoup diminuée, que d'exposer le
malade aux ravages du séjour de la matière, lequel ne doit jamais
faire lorsque le malade par courage, ou par remontrances, veut bien
se soumettre à l'instrument, puisque certainement les douleurs en
sont moins longues et la guérison plus prompte, et que son action
est moins sujette à de dangereuses revolutions, que celle du caustique.
Pour peu qu'on doute si la préférence que je donne à l'instrument
dans l'ouverture de ces Tumeurs est juste, on peut consulter Paré
liv. 7^e chap. 10^e page 166. Dionis p. 692

Nous avons vu que les Charbons et les Anthrax se trouvent
tantôt dans le cas de la simple ouverture, et tantôt dans celui de
l'extirpation, je dis présentement que dans l'une et l'autre de ces opérations,
on ne doit se servir que de l'instrument, parcequ'il donne promptement
issue à la matière arrêtée, et qu'il emporte à l'instant les solides
mortifiés, par conséquent la supuration étant plutôt établie, elle
enlève la crainte des accidens du séjour et du retour de la matière, et
promet une guérison plus prompte et plus sûre. tel est le sentiment de

Il semble que je méprise beaucoup de la pratique des anciens,
lesquels appliquoient ^{sur ces Tumeurs} des vesicatoires et des caustiques, mais la raison ainsi
que l'expérience, en font trop connoître les dangers pour s'y assujétir, et
les heureux succès qu'on eût l'instrument, dans des semblables cas, mêmes
dans les contagions les plus marquées, comme dans les dernières pestes
de Provence, sont trop avérés, pour ne point nous desabuser sur le
caustique dans de pareilles Tumeurs. Cependant lorsque ces Tumeurs

occupent des corps glanduleux, que l'on ne peut point enlever par l'instrument, l'expérience nous apprend qu'il est dangereux de les inciser, parceque la matiere lymphatique qui les engorge, ne pouvant point supurer, il ne s'échappe de la glande qu'une serosité chargée de tels ~~corrosifs~~, plus capable de causer des durités, que d'aider à la guérison, de sorte qu'alors après une ouverture ou extirpation suffisante selon les cas des tegumens enflammés ou mortifiés, on peut emporter la glande avec le caustique lorsqu'il en bien ménagé. Cette règle cependant ne doit avoir lieu, que lorsqu'il n'est pas possible de le faire avec l'instrument.

Les Tumeurs sont des Tumeurs si communes qu'il n'en point de Chirurgien, qui ne sache par sa propre expérience, que dans leur ouverture on doit toujours donner la préférence à l'instrument, parceque la Tumeur enflammée et douloureuse, seroit si irritée par l'action du caustique, que certainement les accidens augmenteroient ~~au lieu de diminuer~~ dans son action au lieu de diminuer; et quoiqu'il se trouve souvent au profond de la Tumeur une matiere lymphatique gypseuse et d'une difficile supuration, cependant la chaleur dureté de la Tumeur, se chauffe assez, pour en exciter la fonte et la supuration, sans avoir recours au caustique.

Toutes les Tumeurs causées par la transformation des lues en une substance charnue, doivent être extirpées avec l'instrument, parceque les lues qui produisent ces Tumeurs sont d'un caractère à occasionner de grands desordres, lorsqu'ils sortent des bornes qu'ils se sont formés dans leur transformation, deff de sorte donc que si on y appliquoit un caustique à dessein de devorer la Tumeur, il arriveroit non seulement, que les irritations vives et constantes que produiroient les parties aeres du caustique, causeroient des douleurs si violentes, qu'elles ^{entraîneroient} ~~entraîneroient~~ après elles l'inflammation, la fièvre et autres accidens, mais encore que les parties du caustique excitant pour l'ordinaire une détermination de mouvement dans l'humeur qui produit ces Tumeurs, qu'il la fait dégénérer en tels corrosifs, qui obervent la ~~Tumeur~~ Tumeur et la font devenir charnue.

Je ne crois pas sortir de ma matière en rendant raison de cette seconde transformation, puisque certainement le caustique que je rejette en seroit la principale cause, si on l'y appliquoit, parceque ces Tumeurs étant composées de vaisseaux de tout genre, dont l'accroissement est soutenu par leur rapport mutuel, il ne peut arriver que l'on dérrange cet assemblage de tuyaux, produits contre les loix de la nature, soit par leur simple division, ou par l'application du caustique, que l'on ne change comme nous l'avons déjà dit l'ordre du mouvement qui se passe entre le fluide et le solide de la Tumeur, par conséquent le caustique irritant les nerfs ils acquièrent une roideur consensuelle qui étrangle les vaisseaux et retient les liqueurs, qui ne les parcourent déjà que d'un mouvement très languissant, ce qui fait que par leur séjour ou leur mélange avec les parties du caustique, elles deviennent susceptible d'une fermentation, qui les rend capable de produire dans la Tumeur tous les désordres que l'on remarque dans le Cancer.

L'expérience me confirme plus d'une fois cette vérité contre le sentiment de Delais de Gendron p. 106 qui vante fort un caustique dont il attribue l'origine de ces Tumeurs, lequel tâche de prouver par la double cure d'un Epulis, cure qui paroit plus étudiée qu'elle n'est effective. La pratique des plus grands Chirurgiens, n'approuve que l'instrument dans l'extirpation de ces Tumeurs, excepté la ligature dans celles d'un petit volume, et dont la base est extrêmement étranglée, et quelques fois un puissant dissolutif, plutôt qu'un consommatif, dans celles d'une consistance mole et fermeuse. Si peu que l'on soit curieux d'autorités, on en aura Paul. L. 6 p. 13 Fabrice d'Acquapendente 2 parties p. 591. Paré L. 4^e chap. 4^e p. 188. Feullet. obs. 24 p. 169. obs. 92 p. 361. Barbette article. 14 p. 343. Celse p. 323. et 347. Après avoir prononcé sur les Tumeurs sanguines, voyons le parti qu'on doit prendre dans les lymphatiques.

Généralement parlant le caustique a quelque chose de moins dangereux dans les Tumeurs lymphatiques, que dans les sanguines, parceque l'humour qui les produit est peu capable de mouvement en



même, et par conséquent, moins sujette aux revolutions qu'il cause, dans les Sanguines; joint à ce que les parties où se forment d'ordinaire ces dépôts deviennent moins sensibles, soit par rapport à la lenteur de la formation de la Tumeur, qui ne porte que si doucement les nerfs au tonus de la douleur, qu'ils en deviennent presque incapable, soit parce que l'humour lymphatique les ramollit ou les divise, au point qu'ils ne peuvent plus recevoir ces secousses impétueuses qui causent la douleur, par conséquent le caustic, ne peut point y produire ces douleurs qui sont la source des troubles les plus fâcheux, qui arrivent dans les Sanguines. De cet exposé général je tire les corollaires suivans.

1^o que dans toutes les Tumeurs lymphatiques qui s'enflamment et qui deviennent douloureuses, on ne doit se servir pour les ouvrir, ou les extirper que de l'instrument, excepté dans les Bubons vénériens et Pestilentiels.

2^o que dans celles qui sont sans adhérences avec la peau, ni avec les autres parties qui les avoisinent, quoique insensibles et dures l'instrument est à préférer au caustic.

3^o dans les Tumeurs lymphatiques, qui sont adhérentes, immobiles, dures, insensibles, le caustic est préférable à l'instrument, pourvu qu'elles ne soient point marquées au caractère du Cancer.

4^o Dans toutes les Tumeurs lymphatiques dures, et dures — simples l'instrument est absolument préférable au caustic. Tachons apreset de confirmer ces principes par les autorités de l'expérience.

Lorsque l'inflammation survient à une Tumeur squisuse, soit que le seul volume de la Tumeur arrête le cours du sang, soit que le sang s'y engage par sa propre disposition, la Tumeur devient douloureuse et suppure souvent, c'est pourquoi on s'outient cette disposition à la supuration par l'application des remèdes convenables, pourvu que rien ne fasse craindre, que la Tumeur puisse dégénérer en cancer; et lorsqu'il s'est fait une collection suffisante de la matière on ouvre la Tumeur avec l'instrument, puis que le caustic y produiroit alors, les mêmes accidens qu'il cause d'ordinaire dans les Tumeurs Sanguines, cependant si

la lymphé qui a d'abord engorgé le corps glanduleux, ne pouvoit point
se fondre dans cette supuration, il faut le consumer avec le caustique, —
supposé quelquelque circonstance empêche de l'extirper avec l'instrument.

Mais dès lors que cette espèce de Tumeur est dans inflammation,
ou lorsqu'elle est peu considérable, que la douleur est légère, et que la
supuration est opiniâtre, on doit se déterminer incessamment à l'ouvrir
avec une trainée de cautères, soit qu'elle soit critique ou symptomatique,
afin de procurer au plutôt la supuration d'une matière, dont la
fermentation ni la coction, ne peuvent être que lentement excitées
par l'application redoublée des remèdes, et que l'ouverture par
l'instrument ne pourroit évacuer que très imparfaitement, par
conséquent on auroit à craindre une délitescence qui seroit suivie de
fâcheux accidens, c'est ainsi qu'agissent les plus grands praticiens dans les
squives des glandes, et sur tout dans les bubons pestilentiels et
vénériens, en observant, qu'on ne doit porter le caustique, qu'avec
beaucoup de circonspection dans les Tumeurs de cette espèce, sous
lesquelles passent de gros vaisseaux; on peut se donner la peine de
lire Fabrici d'Alveopende p. 135. 137. 139. Paré l. 26. chap. 32
p. 129. Barbet article du bubon. p. 425. 428. obs. 3. p. 539.



Séclerc p. 265. Cependant lorsque dans ces Tumeurs la dureté de la matière
qui les produit, annonce qu'elle est incapable de supuration, il faut les extirper
avec l'instrument, si leur situation peut le permettre, et si elles ne sont
tiraient point à quelques parties voisines sans adhérences; mais desquelles ne
se rencontrant point dans cette circonstance, et que quelque raison nous
engage à entreprendre leur cure, on peut alors sans crainte les consumer avec
le caustique. Il est cependant d'expérience que les squives des mamelles, ne doivent
être extirpées qu'avec l'instrument; parceque le caustique ^{ne produiroit} des douleurs
considérables, à cause du nombre des nerfs dont ces parties sont garnies
lesquelles seroient suivies de grands accidens, et ~~produiroient~~ pourroient
porter le trouble ailleurs que dans la partie même; c'est cette même
raison qui nous force à ne point nous servir du caustique pour ouvrir

— on, remède annoncé, que le levain de la Tumeur

Généralement parlant toutes les Tumeurs squirreuses, qui par les douleurs qu'elles causent, annoncent qu'elles sont disposées à dégénérer en Cancer, doivent être extirpées avec l'instrument, lorsqu'elles se rencontrent dans le cas de l'extirpation; parceque si l'on craint les suites du seul enlèvement de l'humueur par les suppurans, combien ne doit on point appréhender dans ce cas l'action du caustique, qui fond et liquéfie l'humueur, dont les sels deviennent alors plus capable d'aguer les Solides souffrans, mais encore parceque dans son action, il ronge les Solides et y cause des divisions si sensibles, qu'elles jettent puissamment le trouble dans le corps et la partie.

L'art nous fournit deux moyens de traiter les Tumeurs cancéreuses, l'un par la cure radicale, et l'autre par la palliative, lorsque les raisons de l'adhésion, de la nature de la partie, du tempérament du malade et de son âge nous forcent à ne point toucher à la Tumeur; c'est dans ce cas où l'application des repereursifs est la plus avantageuse. Il est passé en usage depuis plusieurs siècles, parmi les plus fameux Chirurgiens, que la guérison radicale des Tumeurs cancéreuses, n'a pu s'obtenir qu'en les extirpant avec l'instrument tranchant; parcequ'en effet les douleurs cruelles, qui accompagnent ces sortes de Tumeurs, et l'inflammation dont elles sont pour l'ordinaire environnées requièrent à l'application du caustique, qui ne sert alors qu'à augmenter les douleurs, à éparouiller les liqueurs, et par conséquent à jeter le désordre de plus en plus dans la partie, ce qui est confirmé par ~~de~~ Alius chap 45. l. 16. Celse livre 6. p. chapit. Fabrice d'Acquapendente. p. 182. Paré l. 7. chap. 31. p. 150. chap. 32. p. 151. feultel table 46. p. 225. obs. 52. p. 318. Leclerc. p. 331.

Il semble que le cancer dans son commencement, étant peu différent du squirre, puisque son volume peu considérable, ne blesse point l'action des parties, où la limphe est encore endurcie, et dans lequel les sels ne portent point leur action sur les Solides, il semble dire, que ce calme n'annonce point de mauvais suites du caustique, cependant, on ne doit

point l'hasarder sur ces apparences trompeuses, car les levains n'attendent (si l'on peut ainsi s'exprimer) qu'un secours capable de les débarrasser, afin de produire tous les ravages dont ils sont capables, ce qui ferait le caustic, qui augmenteroit leur malignité: Ainsi il n'est point de moyens plus sûrs et plus prompts, pour extirper ces Tumeurs que l'instrument dans tous les cas possibles, et les tentatives du caustic ont été trop malheureuses pour oser le risquer, ainsi que l'assure Scultet obs. 54^e page 318. Ce qui nous doit faire défier de tous ces sectaires de Vanhelmont et de Paracelse, qui vantent dans la cure des Cancers, toutes les préparations arsénicales, par la conformité qu'ils y font rencontrer avec le levain de la Tumeur.

L'exemple d'une Loupe devenue cancéreuse, fut entièrement défabusé sur l'usage du caustic, dans toutes les Tumeurs qui tiennent de la nature du Cancer, jusqu'en voulant consumer les chairs baveuses, par le moyen d'un léger consommptif, les douleurs devinrent plus cruelles, et les ravages de l'ulcère plus considérables, en sorte qu'il n'y eut que l'extirpation par le moyen de l'instrument, qui termina heureusement la maladie.

Toutes les Tumeurs fongueuses qui ne sont point adhérentes, dont la base est étroite et qui sont douloureuses doivent être extirpées avec l'instrument, parceque la cure en est plus prompte et moins sensible; mais lorsque la Tumeur est adhérente, que sa base a beaucoup d'étendue et qu'elle est peu douloureuse, on peut la consumer avec le caustic, parcequ'il fond la limphe grossière et visqueuse et excite une supuration, qui emporte non seulement l'humour fixée, mais encore les solides, transformés pour ainsi dire, en une substance que la supuration ne sauroit emporter, et on ne craint point tant dans ce cas le caustic, que dans le Cancer, parceque le levain en est moins fermentatif. Cependant si la Tumeur étoit dans cette circonstance étoit fort douloureuse, il faudroit bien de donner garde d'y toucher avec le caustic, parceque cet accident, semble annoncer que le levain de la Tumeur

eventé corrosif, et par conséquent que l'on mélange avec le caustic.
pouvoit produire des ravages considérables. Voies Paré chapitre.
21^e page 175. Paul liv.^{6^e} et Celse p. 511. Fabrici Deliquapende L. 1. p. 164. 170

Pour ne rien laisser à désirer, on peut dire en général, qu'il est plus
raisonnable d'ouvrir avec l'instrument qu'avec le caustic, toutes les
Tumeurs lymphatiques dans lesquelles la parfaite coction de la matière
est désignée, parceque non seulement la guérison, en est plus prompte,
mais encore enque cette coction, annonce que la matière arrêtée, n'a
point contracté de fortes adhérences, et par conséquent, que celle qui
ne s'est point encore épanchée, peut aisément s'échapper dans la suite
de la supuration. Au contraire lorsque dans ces Tumeurs la ^{et supuration} ~~coction~~ est
imparfaite, que les environs en sont durs, cela marque que la matière
est grossière et visqueuse, et peu capable de fermentation, par conséquent
si on les ouvre avec l'instrument, cela en retarderoit la guérison, et je
suis persuadé que c'est ce qui a donné lieu à cette idée populaire, que
lorsqu'on touche avec l'instrument aux Tumeurs serophuleuses, qu'elles se
guérissent plus difficilement, ce qui est cependant un abus détruit par la
raison et l'expérience; il est cependant vrai de dire, et l'expérience nous
le confirme, qu'il est des Tumeurs lymphatiques dans lesquelles de cette
dernière espèce et que nous avons déjà désignée, dans lesquelles le caustic
est à préférer à l'instrument, parcequ'il fond et liquéfie la lymphes arrêtée
dans ses tissus, et qu'il procure une prompte supuration, ce qui est
confirmé par Meis obs. 5^e page 162; au lieu que l'instrument
ne faisant que diviser les parties solides, sans donner du mouvement
au fluide arrêté, il arrive qu'il ne s'échappe des tissus divisés, qu'une
serosité chargée de quelques souches grossiers, qui rendent l'ouverture
baveuse, et souvent la lymphes arrêtée, se durcit dans ses tissus et
forme des duretés très difficiles à détruire.

Lorsque les Tumeurs enkistées, ont une base étroite, et qu'elles ne sont
point adhérentes, elles doivent être extirpées, avec l'instrument, afin de
ménager les parties, de procurer une guérison plus prompte, et de faire une
cicatrice moins difforme, que celle que produiroit le caustic qui laisseroit long
temps le malade en butte aux traits d'une douleur, qui pour être légère
rien seroit pas moins capable de le décourager, et peut-être de causer dans

la partie des accidens, que l'instrument auroit certainement évités.
 Quand bien même ces Tumeurs seroient adhérentes à la peau, si que leur base seroit large, pourvu qu'elles ne soient point attachées dans le reste de leur circonférence à des parties à respecter, elles doivent de même être extirpées avec l'instrument, et toute la différence qu'on peut mettre entre les opérations qui conviennent aux unes et aux autres; c'est que dans les premières, après avoir ouvert les tégumens, on en sépare la Tumeur, afin d'emporter le Kiste en entier s'il est possible; mais dès lors que dans cette opération le Kiste ne pourra point être extirpé, il faut absolument, si une supuration raisonnable ne pouvoit point le détacher, le consumer avec le caustique qui le fait supurer: au lieu que dans les dernières, on emporte d'un seul coup la Tumeur avec les tégumens, en observant les ménages le plus qu'il est possible. ^{afin d'éviter la guérison} Cette pratique est confirmée par Celse livre 7^e. chap. 6^e. Paré liv 8^e. chap. 22^e. page 174. scultet page 141. et 143. obs. 23 page 271. obs. 26. page 277. obs. 88 page 355. Barthe article 5^e page 350 et 352. Dionis. 704. 705 et M^r Garangeot chap. 33. page 466, où la pratique des plus grands Chirurgiens de Paris est exactement détaillée. Leclerc p. 380. et Fabric d'Aquapende p. 110 et 111.

Cependant lorsque les Tumeurs enkistées sont adhérentes à des parties respectables, ce qu'on se trouve dans la nécessité de les extirper, il vaudroit mieux alors (pourvu que ces Tumeurs ne fussent point recouvertes de ces parties) en entreprendre l'extirpation, avec un caustique dont on connoisse l'action; par ce qu'il est plus prudent d'exposer le malade aux incommodités d'une douleur lente, que de risquer de tomber dans des accidens, que l'instrument pourroit produire, et qui pourroient faire périr le malade. Il s'agit dans ces cas de faire en sorte, que le caustique n'emporte la Tumeur que couche par couche, jusqu'à ce qu'on soit parvenu au lieu de l'adhérence, alors on excite une forte supuration, par les topiques les plus pourrifiants, et par ce moyen on détache la portion adhérente et on la fait quitter prise: C'est ainsi que j'ai guéri une Tumeur enkistée, si tuée au dehors de la clavicule, qui étoit adhérente dans toute sa base.

Les Tumeurs lymphatiques, à la formation desquelles la voracité a presque autant ou plus de part que la limphe, et où la limphe n'a point contracté de fortes adhérences avec les solides, ainsi qu'il arrive dans l'adème et l'Anasarque doivent presque toujours être ouvertes avec

nement, et rarement avec le caustic. voirs Fabrice d'Acquapendente p. 128. 40

Lorsqu'on se trouve obligé d'ouvrir les *Adèmes*, ou *Anazarques*, c'est plus pour prévenir la mortification, qui semble être anoncée par l'inflammation et la douleur, dont ces Tumeurs sont quelques fois accompagnées, que pour évacuer la matière qui s'y trouve contenue, alors elles doivent être ouvertes avec l'instrument, qui donne du large aux parties et diminue leur étranglement, que le caustic augmenteroit par l'érelisme que cause d'ordinaire laere dans les solides; et lorsqu'on ouvre ces Tumeurs seulement à dessein de former un égou, pour le coulement des liqueurs enorgées et infiltrées, il est plus à propos de le faire avec l'instrument qu'avec le caustic, dont l'action seroit alors très languissante, à cause que les parties seroient noyées par la serosité infiltrée, et si elles conservoient malgré cela assez de force pour diviser les solides, il pourroit arriver, qu'étant trop étendues, elles produiroient une escare large, et par conséquent plus difficile à reparer.

Il ne me reste plus pour finir cette partie, qu'à parcourir les Tumeurs comprises, sous le nom général d'*Hydropisie*, dont nous avons assigné plusieurs espèces, connues sous les noms d'*Hydrocéphale* lorsqu'elles arrivent à la teste, d'*Hydropisie* de poitrine, lorsqu'elles sont à la poitrine d'*Ascite*, si elles se forment au bras-ventre, et d'*Hydrocele* quand elles attaquent les bourses. Nous avons vu dans la première partie de ce discours que toutes ces Tumeurs devoient être ouvertes, à l'exception quelques fois de l'*Hydrocele*, nous dirons apresant quelles doivent absolument l'être avec l'instrument, pour les raisons que nous allons assigner.

Lorsque dans l'*Hydrocéphale*, les eaux sont répandues sous le Crâne, il n'y a que le trépan qui puisse en procurer l'issue, et lorsqu'elles sont infiltrées dans les parties extérieures, les ouvertures que l'on est obligé de faire çà et là, ne doivent être faites qu'avec l'instrument, à cause de la sensibilité du péri-crâne, et du commerce qu'il y a entre les parties extérieures et les intérieures, ^{par le moyen des nerfs} de sorte que les irritations que causeroit le caustic, passeroient promptement au cerveau, ce qui y produiroit des desordres capables de causer la mort; cependant il pourroit arriver, qu'une ouverture faite avec le cautere à la nuque

X voirs —
mureux aux
severius
de la meden
sfiene

afin de former un égou pour le coulement des eaux, n'y auroit que
 que très utile, ainsi que le pense Leclerc p. 371. Barbote p. 329.
 Il n'est point de Chirurgien qui ne sache que dans tous les
 épanchemens qui s'ont dans la poitrine, soit que la matiere forme
 une éminence entre les côtes ou non, que l'ouverture ne doit être faite
 qu'avec l'instrument tranchant, de la même manière que l'on fait
 l'opération de l'empyème, ou avec le trois-carts, unique moyen dont les
 Chirurgiens se servent pour vider les eaux contenues dans le ventre
 des hydropiques, depuis que Januarius la mis en usage; ce qui fait qu'ils
 ont abandonné la lancette dont on se servoit pour faire cette ouverture, et
 encore plus le cautere actuel, dont les anciens medecins se servoient, ainsi
 qu'on peut le voir dans *Albucasis* Chap. 53. l. 1; et si peu qu'on soit
 instruit de la nature de ces parties, on jugera du danger où on exposerait
 le malade si on n'y faisoit le cautere pour ouvrir ces Tumeurs.

Nous avons vu enfin que l'*Hydrocele* étoit produit, quelques fois
 par l'épanchement de la serosité, que souvent elle n'étoit qu'infiltée
 dans le tissu des parties, et que d'autres fois elle étoit renfermée dans
 une poche particulière. Lorsque les eaux ne sont qu'infiltées, et que
 les Hydropiques n'ont eu aucun sucs, beaucoup de Chirurgiens se contentent
 de faire plusieurs scarifications sur toute l'étendue de la Tumeur, pour
 laisser écouler les eaux; d'autres font simplement une ouverture à
 chaque côté du scrotum, et d'autres enfin se sont servis du staton, dont
 les sucs ne sont point si heureux, que des moyens précédens.

Quand les eaux sont épanchées dans le scrotum, on ouvre
 seulement ^{la Tumeur} avec le trois cart, afin de procurer le coulement de celles qui s'y
 trouvent répandues, et nous ne nous servons plus dans ce cas de la lancette,
 comme l'en est servi Galien, ainsi qu'il le dit au 14^e li. de la
 meth. Chap. 13, et nous y répétons le cautere actuel, comme le marque
Daléchamps Chap. 62 p. 575; mais lorsque la serosité est renfermée
 dans un kiste, on voit presque toujours, après l'évacuation de cette liqueur
 par le trois-carts, la Tumeur renâche peu de tems après; c'est ce qui à

déterminé les praticiens, lorsque cette espèce d'Hydrocele, n'étoit
point une suite de l'Ooite, à ouvrir la Tumeur dans toute son
étendue, afin d'emporter le Kiste, de tarir par ce moyen la source
des eaux, et empêcher la reproduction de la Tumeur. Dans ce dessein
ils se sont servis de moyens différens pour faire cette extirpation, les
uns vantent beaucoup le caustique, comme Le clerc p. 338. parceque
les scars qu'il produit, les mets plus aptes à extirper le Kiste, d'autres
lui préfèrent, et avec beaucoup de raison l'instrument (Voies Parangon
p. 281.) dont les suites sont bien moins facheuses, lorsqu'il est
conduit par des yeux éclairés, et par une main adroite, parceque
le caustique étant beaucoup détrempé, son action se porte indifféremment
de tout costé, et peut attaquer des parties, que l'instrument bien ménagé
ne peut point léser; et il est d'expérience, que toutes les Tumeurs de cette
partie, soit qu'elles soient formées par des eaux, ou quelque autre matière
ne doivent être ouvertes, ou ~~ent~~ extirpées, lorsqu'il en est nécessaire,
qu'avec l'instrument, parceque la sensibilité de ses parties, ne peut
souffrir l'action du caustique, qu'il n'en résulte de facheux accidens, ainsi
que le remarque Garbete p. 332.

Crainte qu'il ne manque quelque chose à cette dissertation, et de ne
point remplir entièrement le dessein, que l'illustre académie de
Chirurgie a eue en proposant la question que mon foible génie a tâché
de résoudre, il me semble nécessaire d'ajouter en peu de mots, la méthode
dont on se sert dans le traitement des Tumeurs offeuses, et comme la
plûpart de ces Tumeurs sont presque toujours une suite de quelque
vice particulier, comme Vénérien, scorbutique, scorbutique et Chancreux,
on me permettra de dire, qu'on ne doit jamais entreprendre la cure
de la cause locale, qu'on n'ait auparavant remédié à la cause universellement
repandue dans tout le corps, par les remèdes propres, sinon on n'en
viendra jamais à bout.

Lorsque par quelque cause que ce soit, quelquesunes des lames extérieures
des os viennent à être divisées, la sue nourricière s'épanche sur la surface,
y acquiert par l'accumulation de tems la même dureté des os et forme une
Tumeur connue sous le nom d'Exostose Mollus: Tandis que le volume
Tumeur, ne gêne point l'action des parties qui l'avoisinent,
il pourroit ar

le malade y fait souvent peu d'attention, et le Chirurgien qui en est instruit, ne s'attache simplement qu'à la détruire, par le moyen des fondans; mais dès que son volume vient à augmenter, il survient des accidens, qui nous engagent à chercher des moyens plus sûrs, pour en procurer la guérison, et il n'y a alors que l'extirpation, qui puisse le faire radicalement, ce qui ne peut s'obtenir que par le moyen des rugines, du ciseau, et du caustère actuel, si les premiers moyens n'étoient d'aucun succès, car le caustère dans ces tumeurs, causeroit des ravages considérables, non par rapport à l'os, sur lequel il auroit peu d'action, mais à cause du périoste qui le recouvre, dont la sensibilité ne peut supporter l'action du caustère, qu'il n'en arrive des accidens fâcheux, en observant qu'on n'entreprend ces opérations, qu'après avoir découvert la substance de l'os tuméfié, par des incisions convenables, et mis les parties molles à l'abri des impressions de l'instrument, ou du caustère actuel.

Il arrive souvent lorsque le Sue nourricier des os vient à changer de caractère, et que les os qui ont la part la plus importante dans leur nutrition, sont embarrassés par des Sues visqueux, ou noyés par trop de Sues, alors cette Sève nourricière altérée, s'arrête dans les canaux, elle les obstrue, et venant à se glisser dans leur substance, elle dissout toutes les cristallisations des ^{os} qui ont rempli les moules spermatiques, et ramollit de façon les fibres osseuses, qu'elles deviennent en état de céder au volume des Sues qui s'y arrêtent et forme une Tumeur dure, peu sensible dans le commencement, sur tout lorsqu'elle n'a été que le milieu des os, et leur substance compacte, à qui on a donné le nom d'Exostose. Lorsque cette espèce de Tumeur résiste à l'action des topiques, que l'on y applique à dessein de les résoudre, et que l'administration des fondans et des apéritifs ont blanchis, elle doit absolument être extirpée, si l'on veut en procurer la guérison, ce qui ne peut s'obtenir de faire, qu'avec la rugine, le ciseau, la gouge, ou le caustère actuel; et le caustère n'y a pas plus d'avantage, que dans la Tumeur précédente, en observant que dans l'une et l'autre, on ne doit se servir du caustère actuel, que lorsque les autres moyens ne peuvent les détruire, et lorsqu'on se trouve dans l'incertitude, il faut prendre garde de ne point caustériser la partie saine de l'os, ce qui retarderoit beaucoup la guérison. voici Fabrice d'Acquap.

p. 934, ainsi que le célèbre Mr. Petit dans son traité des maladies, 44

Enfin par quelque cause que ce soit, que la synovie vienne à s'endurcir dans la boîte des articulations, ou qu'elle se pétrifie sur les ligaments, elle donne lieu à une Tumeur dure, plus ou moins douloureuse qui empêche le mouvement de l'articulation, que l'on appelle Ankilose. La cure de cette Tumeur n'est point susceptible d'ouverture avec l'instrument, excepté quela matiere platreuse ne fût au dehors de l'articulation, ou que celle qui s'y trouve renfermée ne se liquéfie, et ne vienne à supuration, car dans l'un et l'autre cas, après une ouverture bien ménagée des tégumens, il n'est point d'avis expérimenté, qu'on ait guéri de semblables Tumeurs, les unes en emportant par le moyen de la vagine la matiere endurcie, et les autres en évacuant la matiere purulente; et l'on s'en est comblé en il seroit dangereux dans quelque circonstance que la Tumeur se rencontre, d'y appliquer la caustique, à cause des troubles qu'il produiroit dans les tendons, les nerfs et les gros vaisseaux qui environnent ces parties. Enfin lorsque la Tumeur comprend toute l'articulation, qu'elle est ancienne, que le membre est considérablement atrophie, et que l'application des remèdes les mieux indiqués, et l'agitation de la partie, ont été sans succès, il n'est point d'autre moyen de guérison que l'amputation du membre.

Voilà ce qui me parût nécessaire d'exposer, pour la décision de la Question, trop heureux! si cela étoit suffisant pour remplir le desir de ces Illustres Chirurgiens qui l'ont proposée, et si le peu de délicatesse de mon style, ne dépassoit point les verités, que je tiens d'annoncer sur l'expérience des plus grands Chirurgiens de ce siècle, ainsi que des antérieurs, et s'il ne pouvoit point rebuter ceux qui voudroient bien se donner la peine de les lire.

Scripta Jacobus YVONS Chirurgorum
Parisientium Alumnus.



le sur
la m
des
la

il pourroit en